



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

KARIZOO



KARIZOO

ANTIBIÓTICOS

CLOR SP 250.....5
Premezcla medicamentosa para porcino.
Clortetraciclina+Sulfa+Penicilina

ENROKARIZOO 20%.....6
Solución oral para administración en agua de bebida para aves.
Enrofloxacina

KARENCOL SOLUBLE.....7
Solución oral para administración en agua de bebida para aves.
Enrofloxacina + Colistina

KARIDOX 10%.....8
Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y avicultura.
Doxiciclina

KARIDOX 50%.....8
Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura y pavos.
Doxiciclina

KARIFLOR 2%.....9
Premezcla medicamentosa para aves y porcinos.
Florfenicol

KARIFLOR SOLUBLE 10%.....9
Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y aves.
Florfenicol

KARIFLOR 30%10
Solución inyectable para porcino y bovino.
Florfenicol

KARIFLOR 8%.....10
Premezcla medicamentosa para aves y porcino.
Florfenicol

KARIMOX 20% PREMIX.....11
Premezcla medicamentos para aves y porcino.
Amoxicilina

KARIMOX 80%.....12
Polvo para administrar en agua de bebida en aves y porcino.
Amoxicilina

KARIMULINA 12.5%.....13
Solucion para administracion en agua de bebida.
Tiamulina

KARIMULINA 10% PREMIX..... 14
Premezcla medicamentosa para porcino.
Tiamulina

KARITIL PREMIX15
Premezcla medicamentosa para porcino.
Tilmicosina

KARITIL ORAL 16
Solución oral para bovino, porcino y aves.
Tilmicosina

KARITIL 30% INYECTABLE.....17
Solución inyectable para bovino.
Tilmicosina

KARITIL PREMIUM LA17
Solución inyectable para bovino.
Tilmicosina

LINCO K 11% PREMIX 18
Premezcla medicamentosa para porcino.
Lincomicina

LINCO-K 400 19
Polvo para administración en agua de bebida.
Lincomicina

MARVETIN.....20
Solución inyectable para porcino y bovino.
Marbofloxacina

OXIKARIZOO20
Solución inyectable para porcino, bovino, caprino y ovino.
Oxitetraciclina

NUEVO LANZAMIENTO ECOSIN21
Premezcla en polvo para porcinos y aves.
Tilvalosina + Clortetraciclina

NUEVO LANZAMIENTO VALOTET.....21
Premezcla en polvo para porcinos y aves.
Tilvalosina + Oxitetraciclina

EUBIÓTICOS

NUEVO LANZAMIENTO GASTROHERB22
Premezcla de aceites esenciales y ácidos orgánicos en polvo para porcinos.
Ácido tánico + Timol + Carvacrol

ANTICOCCIDIALES

KARICOX 2,5%23
Solución para agua de bebida en avicultura y pavos.
Toltrazurilo

KARICOX 5%.....24
Suspensión oral para porcino y bovino.
Toltrazurilo

ANTIPARASITARIOS

KARIVER 1%.....25
Solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino.
Ivermectina

HORMONALES

SINCRO K26
Solución inyectable.
Agente luteolítico y sincronizador de celo.
D-Cloprostenol

NUTRICIONALES

KARIVIT AD₃E26
Solución inyectable para porcino, bovino, caprino y ovino.
Vitamina A + Vitamina D₃ + Vitamina E

LÍNEA PHYTOSOLUTIONS

COXSAN LÍQUIDO27
Mezcla de aceites esenciales promotora del crecimiento.
Orégano y Ajo

COXSAN PREMIX.....28
Premezcla promotora del crecimiento a base de aceites esenciales.
Orégano y Ajo

LICOROL29
Mezcla mucolítica y expectorante a base de aceites esenciales.
Eucaliptol y Mentol

PHYTMAX BEEF CATTLE29
Premezcla estimulante del apetito y promotora del crecimiento.
Cinamaldehído + Capsicum + Eugenol

PHYTMAX DAIRY COW30
Premezcla promotora de la producción láctea.
Cinamaldehído + Anetol + Eugenol

PHYTOBUTYRIN.....30
Premezcla de monobutirinas y aceites esenciales promotora de la digestión.
Mono, Di y Triglicéridos de ácido butírico y fitogénicos

LÍNEA ANPARIO

BACTACID.....31
Polvo acidificante para cerdos.
Ácidos fórmico y propiónico

PREFECT31
Premezcla acidificante para cerdos y aves.
Ácidos fórmico, propiónico y butírico

PHORCE32
Polvo acidificante para aves y porcinos.
Ácidos fórmico y propiónico

SALKIL.....32
Premezcla acidificante para aves.
Ácidos fórmico y propiónico

NEUTOX33
Polvo adsorbente de micotoxinas.
Aluminosilicatos, pared celular de levadura, kieselgur, propionato de calcio

OREGO-STIM (POLVO Y LÍQUIDO)34
Polvo y líquido con aceite esencial de orégano.
Carvacrol y timol

Empresa

Laboratorios KARIZOO es una empresa de origen familiar fundada en 1983 dedicada a la fabricación y distribución de productos de sanidad y nutrición animal. Desde 2016 pertenece al grupo multinacional ALIVIRA (Corporación SeQuent) dedicado en su totalidad al sector farmacéutico veterinario, con su sede principal en la India. En mayo de 2020 la firma de inversión global Carlyle adquiere una participación accionaria en SeQuent, fortaleciendo al grupo a nivel global.

El compromiso de Laboratorios KARIZOO y el grupo ALIVIRA con el sector veterinario a nivel mundial, hace que nuestra misión se convierta en el mejor valor de la compañía para desarrollar nuevos productos, con la máxima calidad, seguridad y eficacia.

El espíritu innovador y la filosofía de mejora permanente nos impulsa hacia nuevos retos con el objetivo de hacer llegar nuestros productos a nuevos mercados en todo el mundo.



KARIZOO

AN ALIVIRA GROUP COMPANY

Nuestro objetivo es mejorar la sanidad y el bienestar de los animales de producción.

Company

Laboratorios KARIZOO is a family owned business founded in 1983 dedicated to the manufacturing and distribution of animal health and nutrition products. Since 2016 being part of the multinational group ALIVIRA (SeQuent Corporation), dedicated to the veterinary pharmaceutical sector, with its main headquarters in India. In May 2020 the global investment firm Carlyle acquires an equity stake in SeQuent, strengthening the group globally.

The commitment of Laboratorios KARIZOO and the ALIVIRA group with the veterinary sector worldwide, makes our mission the best value of the company to develop new products, with the highest quality, safety and efficiency.

The innovative spirit and the philosophy of permanent improvement drives us to new challenges with the aim of getting our products to new markets around the world.

ANTIBIÓTICOS



CLOR SP 250

Clortetraciclina+Sulfa+Penicilina

Premezcla medicamentosa para porcinos.

Reg. Q-0265-023



20 kg

COMPOSICIÓN

Clortetraciclina 4.4 g · Sulfadimidina 4.4 g · Penicilina G procaína 2.2 g · Aceite mineral 0.5 g · Vehículo csp 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos.

DOSIS

Administración por vía oral, en el alimento. Adicionar 3 kg de Clor SP-250/1000 kg de alimento desde el destete hasta los 35 kg de peso en forma continua. También se puede adicionar 3 kg de Clor SP-250/1000 kg de alimento mientras se mantengan los síntomas y proporcionar durante un periodo posterior de 5 a 7 días. Para efecto terapéutico, emplearlo según el criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES

Antimicrobiano para gérmenes susceptibles a la clortetraciclina, sulfamidina y penicilina G procaína. Como preventivo para trastornos entéricos, rinitis y neumonía bacteriana primaria y secundaria.

Para el tratamiento de enteritis bacteriana asociada a *E.coli* y enteritis necrótica asociada a *Salmonella*. Mantiene los incrementos de peso en presencia de rinitis atrófica.

TIEMPO DE RETIRO

Carne y Visceras: 8 días antes del sacrificio.



ANTIBIÓTICOS



ENROKARIZOO 20%

Enrofloxacin

Solución oral para administración en agua de bebida para aves.

Reg. Q-0265-018



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 200 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Aves (broilers).

DOSIS

Administrar por vía oral en el agua de bebida. Pollos de engorda: 50 mL de Enrokarizoo 20% por kg de p. v./día) equivalente a 10 mg de enrofloxacin/kg p. v./día. Duración del tratamiento: 3 – 5 días.

Debido a la forma de consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

Renovar el agua medicada cada día.

INDICACIONES

Pollo de engorda: Tratamiento de infecciones causadas por *E. coli*, *Salmonella spp.* y *Mycoplasma spp.*

OTRAS INDICACIONES:


Consumir como máximo 3 meses tras la apertura del envase original.

Validez del agua medicada: 24 horas.

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 4 días antes del sacrificio.



KARENCOL SOLUBLE

Enrofloxacin/Colistin

Solución oral para administración en agua de bebida para aves.

Reg. Q-0265-017



ANTIBIÓTICOS



COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 100 mg/ml.

Colistin sulfato 50 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Aves (Pollo de engorde y pavos).

DOSIS

Administrar vía oral, en el agua de bebida. Karencol Soluble se administra en una concentración de 0.1 ml/kg p. v. durante 3 a 5 días (Enrofloxacin 10 mg/kg y colistin sulfato 5 mg/kg). Recomendaciones para el manejo del producto: Teniendo en cuenta que el 10% del contenido del envase es enrofloxacin y el 5% corresponde a colistin sulfato.

$$\frac{\text{cantidad de Karencol Soluble (por 1000 litros de agua)}}{\text{consumo total de agua por instalación en el día anterior (en litros)}} = \frac{\text{número de animales x peso promedio de un animal (en kg) x 100}}{\text{consumo total de agua por instalación en el día anterior (en litros)}}$$

INDICACIONES

Karencol Soluble es una solución antimicrobiana de amplio espectro recomendada para administración oral en el agua de bebida de pollos y pavos, para el tratamiento de enfermedades respiratorias, intestinales y de infecciones sistémicas causadas por gérmenes sensibles a la combinación de la enrofloxacin y de la colistin sulfato.

Está indicado para el uso en los casos de: Enfermedad respiratoria crónica (*Mycoplasma gallisepticum*, *E.coli*); enfermedad de los sacos aéreos (*Mycoplasma meleagridis*); sinovitis infecciosa (*Mycoplasma synoviae*); colibacilosis (*E.coli*); salmonelosis (*Salmonella spp.*); cólera aviar (*Pasteurella multocida*); bordetelosis en pavos (*Bordetella avium*); coriza aviar (*Haemophilus paragallinarum*); erisipelas (*Erysipelothrix rhuspathiae*); staphylococcosis (*Staphylococcus aureus*) y clamidiosis (*Chlamydia psittaci*).

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días antes del sacrificio.

Visceras y derivados: 28 días antes del sacrificio.



ANTIBIÓTICOS

KARIDOX 10%

Doxiciclina

Solución oral para administración en agua de bebida para porcinos y avicultura.

Reg. Q-0265-019



5L

1L

COMPOSICIÓN

Doxiciclina 100 mg/ml.
(equivalente a doxiciclina hclato 116,0 mg).

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos y aves.

DOSIS

11.5 mg/kg p. v./día, equivalente a 0.12 ml/kg p. v., durante 5 días consecutivos.

Administración por vía oral, en agua de bebida.

INDICACIONES

Prevención de enfermedades del tracto respiratorio sensibles a la doxiciclina. Enfermedades del tracto respiratorio causadas por *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibles a la doxiciclina. Previamente al tratamiento, debe asegurarse la presencia de enfermedad en el hato.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 7 días antes del sacrificio.



KARIDOX 50%

Doxiciclina

Polvo para administración en agua de bebida para porcinos, avicultura y pavos

Reg. Q-0265-026



1 kg

COMPOSICIÓN

Doxiciclina 500 mg/g.
(equivalente a Doxiciclina hclato 580 mg).

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos, avicultura, pavos.

DOSIS

23,1 mg/Kg p.v./día (equivalente a 40 mg/kg p. v./día), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas por cepas sensibles a la doxiciclina.

Tratamiento de *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a la doxiciclina.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino

Carne: 4 días antes del sacrificio.

Aves (Pollos)

Carne: 5 días antes del sacrificio.

Aves (Pavos)

Carne: 12 días antes del sacrificio.



ANTIBIÓTICOS

KARIFLOR 2%

Florfenicol

Premezcla medicamentosa para aves y porcinos.

Reg. Q-0265-010



20 kg

COMPOSICIÓN

Florfenicol 20 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos y aves.

DOSIS

Vía de administración: Oral, mezclado en el alimento a dosis de 20-40 ppm*

INDICACIONES

Aves (engorda y reproductoras) y porcinos, para la prevención y tratamiento de enfermedades susceptibles a la fórmula.

TIEMPO DE RETIRO

Carne y Visceras: 5 días antes del sacrificio.




*Consulte a su representante Karizoo para el manejo de dosis superiores a las aquí recomendadas.

KARIFLOR SOLUBLE 10%

Florfenicol

Solución oral para administración en agua de bebida para porcinos y aves.

Reg. Q-0265-011



5L



1L

COMPOSICIÓN

Florfenicol 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Aves y porcinos.

DOSIS

Aves: (pollo de engorda) 20 mg de florfenicol/kg pv/día, durante 3 a 5 días.

Porcino: 20 mg de florfenicol/kg pv/día durante 5 días.

INDICACIONES

Aves (engorda y reproductoras) y porcino: Para la prevención y tratamiento de enfermedades susceptibles a la fórmula.

Actinobacilosis. Complejo Respiratorio Porcino. Pasteurelosis.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino

Carne: 16 días antes del sacrificio.

Aves

Carne: 5 días antes del sacrificio.

Huevo: No administrar a gallinas ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.



ANTIBIÓTICOS



KARIFLOR 30%

Florfenicol

Solución inyectable para bovino, ovino, caprino y porcino.

Reg. Q-0265-014



COMPOSICIÓN

Florfenicol 300 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS

Bovino: Vía SC: 40 mg/kg p. v. (2 ml/15 kg) administrado una sola vez en la musculatura del cuello. El volumen por punto de inyección no debe exceder de 10 ml.

Ovino y Caprino: Dosis única 20 mg/kg IM cada 48hrs. Al aplicar más de dos dosis, la primera es vía IM, las siguientes vía SC. Se recomienda aplicar únicamente bajo vigilancia médica.

Porcino: Vía IM. 15 mg/kg p. v. (1 ml/20 kg) proporcionar 2 aplicaciones con un intervalo de 48 hrs. en la musculatura del cuello. El volumen de la dosis no debe exceder a 5 ml.

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con bacterias susceptibles al florfenicol como *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* y *Actinobacillus pleuropneumoniae* en bovino, ovino, caprino y porcino; así como para el tratamiento de la pododermatitis bovina causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.

TIEMPO DE RETIRO

Carne y vísceras: 2 días antes del sacrificio.

KARIFLOR 8%

Florfenicol

Premezcla medicamentosa para porcinos.

Reg. Q-0265-031



COMPOSICIÓN

Florfenicol 80 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos (engorde y reproductoras).

DOSIS

Vía de administración: Oral, mezclado en el alimento a dosis de 15-50 ppm, que equivale a 187.5- 625 g/1000 Kg de alimento, durante 14 días.

INDICACIONES

Porcino (engorde y reproductoras) para el tratamiento de infecciones respiratorias bacterianas como: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Para el control de ileitis porcina y meningitis por *Streptococcus*.

TIEMPO DE RETIRO

Carne y Vísceras: 2 días antes del sacrificio.



ANTIBIÓTICOS



KARIMOX 20% PREMIX

Amoxicilina

Premezcla medicamentos para aves y porcinos.

Reg. Q-0265-002



COMPOSICIÓN

Amoxicilina (trihidrato) 200 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollo de engorda/broiler) y porcinos.

DOSIS

Vía oral, mezclado con el alimento.

Porcino: 15 a 25 mg de amoxicilina/kg p. v. durante 5 días (equivalente a 75 - 125 mg de Karimox 20% Premix/kg p. v.). 1 a 2 kg de Karimox 20% Premix por 1000 kg de alimento terminado.

Aves (broiler): 15 a 30 mg de amoxicilina/kg p. v. durante 5 días (equivalente a 75 - 150 mg de Karimox 20% Premix/kg p. v.). 1 a 2 kg de Karimox 20% Premix por 1000 kg de alimento terminado.

INDICACIONES

Karimox 20% Premix es un antibiótico semisintético perteneciente al grupo de las penicilinas. Tiene una acción bactericida basada en la inhibición de la síntesis de péptidos, un componente esencial de la pared celular de la bacteria. El espectro de acción de Karimox 20% Premix resulta en numerosos microorganismos Gram⁺ y Gram⁻ como por ejemplo: *Streptococcus spp.*, *Diplococcus spp.*, *Cornebacterium spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus pneumoniae*, *Haemophilus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Bordetella pertussis*, *Neisseria spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus mirabilis*.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino

Carne: 5 días antes del sacrificio.

Aves

Carne: 1 día antes del sacrificio.

Huevo: No consumir huevos procedentes de aves tratadas.



ANTIBIÓTICOS

KARIMOX 80%

Amoxicilina

Polvo para administrar en agua de bebida en aves y porcinos.

Reg. Q-0265-013



COMPOSICIÓN

Amoxicilina trihidrato 800 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Aves y porcinos.

DOSIS

Vía de administración: Oral, en el agua de bebida.

Aves y cerdos: 10 a 20 mg/kg p. v. por día (8 a 16 mg/kg de Amoxicilina trihidratada por 3 días consecutivos).

La dosis deberá aplicarse únicamente bajo prescripción y vigilancia del médico veterinario.

Aves de hasta 4 semanas de edad: 6-12 g Karimox 80% por cada 100 L de agua de bebida.

Aves de más de 4 semanas de edad: 10 a 20 g Karimox 80% por cada 100 L de agua de bebida.

Cerdos de hasta 4 meses de edad: 10 a 20 g Karimox 80% por cada 100 L de agua de bebida.

Cerdos de más de 4 meses de edad: 15 a 30 g Karimox 80% por cada 100 L de agua de bebida.

INDICACIONES

Karimox 80% polvo soluble está elaborado a base de amoxicilina trihidrato indicado para el control y tratamiento de infecciones sistémicas del aparato respiratorio, digestivo y urogenital causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina, así como a los gérmenes sensibles a la penicilina tales como: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Clostridium spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.* y *Escherichia coli*.

TIEMPO DE ESPERA

Porcino

Carne: 15 días antes del sacrificio.

Aves

Carne: 15 días antes del sacrificio.

Huevos: CERO días.



1 kg

ANTIBIÓTICOS

KARIMULINA 12.5%

Tiamulina

Solución para administración en agua de bebida

Reg. Q-0265-020



COMPOSICIÓN

Tiamulina hidrógeno fumarato 125 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos y aves.

DOSIS

Porcinos: 8.8 mg de Tiamulina hidrógeno fumarato por kg p.v. y día; equivale a 10 ml de solución por 142 kg p. v., administrado en el agua de bebida durante 3 a 5 días.

Pollos y pavos: 25 mg de Tiamulina hidrógeno fumarato por kg pv/día (equivalente a 100 ml de solución por 500 kg p. v.) administrado en agua de bebida durante 3 a 5 días.

Si no hay respuesta tras 5 días de tratamiento, se debe restablecer el diagnóstico.

INDICACIONES

Para el tratamiento oral y prevención de la disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae* y complicada con *Fusobacterium spp.* y *Bacteroides spp.*

Pollos y pavos; para reducir la gravedad de la enfermedad causada por *Mycoplasmas*

TIEMPO DE RETIRO

Pollos, pavos y porcinos

Carne: 10 días antes del sacrificio.

Huevo: No autorizado el uso en aves productoras de huevo para consumo humano.



1 L



ANTIBIÓTICOS



KARIMULINA 10% PREMIX

Tiamulina

Premezcla medicamentosa para porcinos.

Reg. Q-0265-024



20 kg

COMPOSICIÓN

Tiamulina hidrógeno fumarato 100 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos.

DOSIS

Administración por vía oral, en el alimento balanceado

Dosis recomendada:

Tratamiento disentería porcina:

Mezclar 1 kg de Karimulina 10% Premix (equivalente a 100 g de tiamulina hidrógeno fumarato) por 1000 kg de alimento balanceado y administrarlo durante 7-10 días.

INDICACIONES

Para el tratamiento oral y prevención de la disentería porcina causada por *Serpulina* (*Treponema hyodysenteriae*) complicada por *Fusobacterium spp.* y *Bacteroides spp.*

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 2 días antes del sacrificio.

ANTIBIÓTICOS



KARITIL PREMIX

Tilmicosina

Premezcla medicamentosa para porcinos.

Reg. Q-0265-005



20 kg

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (fosfato) 200 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos.

DOSIS

Administración oral en el alimento.

Tratamiento: administrar en el alimento un rango de dosis de 200 a 400 g de tilmicosina activa por 1000 kg de alimento durante 10 a 15 días.

Preventivo: Administrar en el alimento una dosis de 200 g de tilmicosina activa por 1000 kg durante el período de riesgo.

INDICACIONES

Karitil Premix está indicado para el tratamiento y la prevención de la neumonía en porcinos en engorda y crecimiento, causados por *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y microorganismos susceptibles a la tilmicosina.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 14 días antes del sacrificio.



ANTIBIÓTICOS



KARITIL ORAL

Tilmicosina

Solución oral para bovino, porcino y aves.

Reg. Q-0265-003

COMPOSICIÓN

Contenido por 1000 ml:
Tilmicosina (fosfato) 250 g.
Excipientes csp 1000 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y aves (engorda y reproductoras).

DOSIS

Administrar en el agua de bebida.

Porcino: 15-20 mg de tilmicosina/kg de pv (1.2 - 1.6 ml Karitil Oral /20 kg pv), equivalente a 800 ml de Karitil Oral por 1000L de agua de bebida, durante 5 días.

Aves: 75 mg de tilmicosina por litro, equivalente a 300 ml de Karitil Oral por 1000 litros de agua de bebida, durante 3 días.

Bovino: 12.5 mg de tilmicosina/kg pv (1 ml Karitil Oral/20 kg pv) durante 3 a 5 días en el agua de bebida.

INDICACIONES

Karitil Oral es un antibiótico macrólido con actividad bacteriostática y/o bactericida según dosis empleada.

Bovino: Para el tratamiento de la neumonía asociada a *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Actinomyces pyogenes*, *Mycoplasma bovis*.

Porcino: Para el tratamiento de las infecciones respiratorias en porcino, asociadas con *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Actinomyces pyogenes*.

Aves: Para el tratamiento de infecciones respiratorias en aves, asociadas con *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino

Carne: 14 días en carne antes del sacrificio.


Bovino

Carne: 42 días antes del sacrificio.

Aves

Carne: 2 días antes del sacrificio.

Huevo: No administrar en aves cuya producción de huevo vaya destinado para consumo humano.



ANTIBIÓTICOS



KARITIL 30% INYECTABLE

Tilmicosina

Solución inyectable para bovinos.

Reg. Q-0265-004



COMPOSICIÓN

Tilmicosina 300 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos.

DOSIS

Administrar una dosis subcutánea de 1 ml por 30 kg pv. La inyección se sugiere aplicar por debajo de la piel entre los hombros y por arriba de las costillas. No inocular más de 25 ml en el mismo sitio de aplicación.

INDICACIONES

Karitil 30% Inyectable tiene una actividad predominante contra agentes Gram⁺, algunos Gram⁻ y Mycoplasmas. Está indicado para el tratamiento de la neumonía asociada a *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y otros organismos susceptibles a la tilmicosina.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días antes del sacrificio.

KARITIL PREMIUM LA

Tilmicosina

Solución inyectable para bovinos.

Reg. Q-0265-030



COMPOSICIÓN

Tilmicosina 350 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos.

DOSIS

Administrar una sola inyección subcutánea de 1ml de Karitil Premium LA por cada 15 - 20kg de peso corporal (17.5 - 23.3 mg/kg).

INDICACIONES

Karitil Premium LA es un antibiótico macrólido indicado para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (BRD) causada por *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* así como, gérmenes asociados en el periodo de secado del ganado lechero, y otros organismos susceptibles a la tilmicosina, como *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus uberis*.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días antes del sacrificio.

Leche: 31 días.



ANTIBIÓTICOS



LINCO-K 11% PREMIX

Lincomicina

Premezcla medicamentosa para porcinos.

Reg. Q-0265-025



20 kg

COMPOSICIÓN

Lincomicina (hidrocloruro) 110 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (destete, crecimiento y finalización).

DOSIS

Vía de administración oral en el alimento balanceado.

Porcino: (destete, crecimiento y finalización):

Preventivo: 44 g de lincomicina base (400 g de Linco K 11% premix) por 1000 Kg de alimento balanceado compuesto durante tres semanas. La medicación preventiva se recomienda en aquellas explotaciones en donde la enfermedad se encuentre de forma endémica aunque los signos todavía no se hayan presentado.

Tratamiento: 110 g de lincomicina base (1 kg de Linco K 11% premix) por 1000 kg de alimento balanceado compuesto durante tres semanas.

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de la disentería porcina.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 6 días antes del sacrificio.

ANTIBIÓTICOS



LINCO-K 40%

Lincomicina

Polvo para administración en agua de bebida.

Reg. Q-0265-021



1 kg

COMPOSICIÓN

Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino, aves.

DOSIS

Administrar 5 – 10 mg /kg pv/día durante un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos (equivalente a 12,5 – 25 mg/kg pv/día). Administración en el agua de bebida.

INDICACIONES

Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira hyodysenteriae* sensibles a la lincomicina.

En aves (pollos de engorda) para el control de la enteritis necrótica causada por cepas de *Clostridium perfringens* sensibles a la lincomicina.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino

Carne: 6 días antes del sacrificio.

Aves

Carne: 2 días antes del sacrificio.

Huevos: No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

ANTIBIÓTICOS

MARVETIN
Marbofloxacin

Solución inyectable para porcinos y bovinos.

Reg. Q-0265-032



COMPOSICIÓN

Marbofloxacin 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino y bovino.

DOSIS

Bovino:

2 ml de Marvetin/25 kg pv por vía intramuscular en una dosis única.
1 ml de Marvetin/50 kg pv por vía intramuscular en una inyección diaria durante 3 a 5 días.

Porcino (engorda y reproductoras):

2 ml de Marvetin/25 kg pv por vía intramuscular en una dosis única.
1 ml de Marvetin/50 kg pv por vía intramuscular en una inyección diaria durante 3 a 5 días.

INDICACIONES

Actividad de amplio espectro in vitro contra Gram⁻ (*E. coli*, *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*) y *Mycoplasma* spp. Indicado en el tratamiento del síndrome respiratorio bovino. En cerdas en el síndrome MMA (mastitis, metritis y agalactia). En cerdos, para el tratamiento de problemas respiratorios causados por cepas sensibles de *Mycoplasma* y *Pasteurella multocida*.

TIEMPO DE RETIRO

Carne y Vísceras: 5 días antes del sacrificio.



250ml 100ml

OXIKARIZOO 300 LA
Oxitetraciclina

Solución inyectable para porcino, bovino, caprino y ovino.

Reg. Q-0265-029



COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina 300 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS

Administrar vía intramuscular profunda.

Bovinos: 1 ml por cada 15 kg pv (20 mg/kg) por vía intramuscular en dosis única.

Porcinos: 1 ml por cada 15-30 kg pv (10- 20 mg/kg) por vía intramuscular en dosis única.

Ovinos y Caprinos: 1ml por cada 15-30 kg pv (10- 20 mg/kg) por vía intramuscular en dosis única.

INDICACIONES

Oxikarizoo 300 LA está indicado en bovinos productores de carne, porcinos productores de carne, ovinos y caprinos productores de carne para el tratamiento de padecimientos ocasionados por bacterias Gram⁺ como: *Streptococcus* β-hemolítico y no hemolítico, *Actinomyces* spp, *Bacillus anthracis*, *Clostridium perfringens* y *tetani*, *Listeria monocytogenes* y *Nocardia*; y Gram⁻ como: *Bordetella* spp, *Brucella*, *Bartonella*, *Haemophilus* spp, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae*, *Shigella* y *Yersinia pestis*. Tiene actividad contra la mayoría de los micoplasmas, espiroquetas, clamidias y rickettsias.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días antes del sacrificio.



250ml 100ml 50ml

ANTIBIÓTICOS

NUEVO LANZAMIENTO
EXCLUSIVO DE LABORATORIOS KARIZOO

ECOSIN

Tilvalosina + Clortetraciclina

Premezcla en polvo para porcinos y aves.

Reg. Q-7241-004



20 kg

COMPOSICIÓN

Tilvalosina 12.5 g · Clortetraciclina 75 g · Vehículo csp 1000 g

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos, aves.

DOSIS

Tratamientos preventivos 2 kg por 1000 kg de alimento.

Tratamientos curativos 4 kg por 1000 kg de alimento.

INDICACIONES

Porcino:

Tratamiento preventivo y curativo de enfermedades respiratorias y digestivas (micoplasmosis, neumonía enzoótica, disentería porcina, enteritis infecciosa, rinitis atrofica). Ayuda a mejorar la conversión alimenticia (engorda y desarrollo). Lechones más pesados al destete.

Aves:

Prevención enfermedades respiratorias. Reduce las reacciones potsvacunales. Tratamiento preventivo y curativo de *Mycoplasma synoviae* y *M. gallisepticum*. Mejora el porcentaje de producción de huevo.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 3 días antes del sacrificio.

NUEVO LANZAMIENTO
EXCLUSIVO DE LABORATORIOS KARIZOO

VALOTET

Tilvalosina + Oxitetraciclina

Premezcla en polvo para porcinos y aves.

Reg. Q-7241-002



20 kg

COMPOSICIÓN

Tilvalosina 25 g · Oxitetraciclina 200 g · Vehículo csp 1000 g

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos, avicultura.

DOSIS

Tratamientos 1 a 2 kg de Valotet por 1000 kg de alimento según la gravedad del caso durante 10 a 15 días.

INDICACIONES

Porcino:

Tratamiento preventivo y curativo de enfermedades respiratorias y digestivas (micoplasmosis, neumonía enzoótica, disentería porcina, enteritis infecciosa, rinitis atrofica). Ayuda a mejorar la conversión alimenticia (engorda y desarrollo). Lechones más pesados al destete.

Aves:

Prevención enfermedades respiratorias. Reduce las reacciones potsvacunales. Tratamiento preventivo y curativo de *Mycoplasma synoviae* y *M. gallisepticum*. Mejora el porcentaje de producción de huevo.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 3 días antes del sacrificio.

EUBIÓTICOS

NUEVO LANZAMIENTO
EXCLUSIVO DE LABORATORIOS KARIZOO

GASTROHERB

Ácido tánico + Timol + Carvacrol

Premezcla de aceites esenciales
y ácidos orgánicos en polvo para
porcinos.



COMPOSICIÓN

Ácido Tánico 6,82 – 8,34 % · Timol 0,3 – 0,8 % · Carvacrol 0,3 – 0,8 %

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos

DOSIS

Mezclar en el alimento a una dosis de 1-3 kg/1000 kg.
La dosis efectiva de producto puede variar por las condiciones de
producción y tipo de alimentación reales.
Se recomienda ajustar la dosis a la necesidad de la granja.

INDICACIONES

Especialmente indicado contra disentería porcina causada
por *Brachyspira hyodysenteriae*.
Como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades bacterianas
intestinales.
Aumenta la actividad de antibióticos tales como Lincomicina y
Tiamulina.
Neutraliza los signos clínicos de la disentería porcina.
Reduce drásticamente los tratamientos antibióticos, disminuyendo el
gasto veterinario.
Mejora de la producción.
No presenta resistencia, por la naturaleza de sus compuestos.
No presenta antagonismo con antibióticos.
Su uso mejora la rentabilidad de la producción porcina.

TIEMPO DE RETIRO
CERO días



20 kg

ANTICOCCIDIALES



KARICOX 2,5%

Toltrazurilo

Solución para agua de bebida
en avicultura y pavos.

Reg. Q-0265-001



1 L



100 ml

COMPOSICIÓN

Toltrazurilo 25 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Pollos y pavos.

DOSIS

Dosis recomendada es de 7 mg/kg pv (equivalente a 28 ml/100 kg pv)
diariamente durante 2 días consecutivos.


INDICACIONES

Para el tratamiento de coccidiosis en pollos y pavos (*Eimeria*
acervulina, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. adenoides*
y *E. meleagridis*)

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 21 días antes del sacrificio.

Huevo: No usar en aves de postura después de la 16ª semana de vida.



ANTICOCCIDIALES

KARICOX 5%

Toltrazurilo

Suspensión oral para porcinos y bovinos.

Reg. Q-0265-006



250 ml

Bomba dosificadora de 1 ml.

COMPOSICIÓN

Toltrazurilo 50 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino y bovino.

DOSIS

Administración vía oral. La suspensión oral debe agitarse antes de su uso.

Porcino: cada lechón será tratado el día 3 a 5 de vida con una dosis única de 20 mg de toltrazuril/kg pv (equivalente a 0.4 ml de suspensión oral por kg pv).

Bovino: Dosis única de 15 mg de toltrazuril/kg pv (equivalente a 3 ml/10 kg pv).

Para el tratamiento de un grupo de animales similares, la dosis a administrar debe ser acorde a la del animal de mayor peso del grupo.

INDICACIONES

Porcino: Prevención de los signos clínicos de coccidiosis neonatal en cerdos (de 3 a 5 días de edad) en granjas con una historia confirmada de coccidiosis por *Isoospora suis*.

Bovino: Para la prevención de los signos clínicos de coccidiosis y reducción de la difusión de coccidios, en becerros y becerras, en granjas con historia de coccidiosis causada por *Eimeria bovis* o *Eimeria zuernii*.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino

Carne y vísceras: 77 días antes del sacrificio.

Bovino

Carne y vísceras: 63 días antes del sacrificio.

Leche: No debe utilizarse en vacas cuya leche se destine para consumo humano.



ANTIPARASITARIOS

KARIVER 1%

Ivermectina

Solución inyectable (subcutánea) para bovino, porcino, ovino y caprino.

Reg. Q-0265-012



500 ml



100 ml



COMPOSICIÓN

Ivermectina 10 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS

Bovino: 1 ml/50 kg pv vía subcutánea (*no aplicar vía endovenosa ni intramuscular*).

Ovino y Caprino: 0.5 ml/25 kg p. v. vía subcutánea en dosis única.

Porcino: 1 ml/33 kg pv vía subcutánea en dosis única.

Administrar por vía subcutánea en el cuello.

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de vermes redondos gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores, y ácaros de la sarna psoróptica y sarcóptica.

TIEMPO DE RETIRO

Bovino, Caprino y Ovino

Carne: 35 días antes del sacrificio.

Leche: No suministrar a ganado productor de leche para consumo humano.

Porcino

Carne: 28 días antes del sacrificio.



HORMONALES



SINCRO K D-Cloprostenol

Solución inyectable.
Agente luteolítico y sincronizador de celo.

Reg. Q-0265-022



20 ml

COMPOSICIÓN

D-Cloprostenol 0.075 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

DOSIS

Vacas: Administrar la dosis por inyección intramuscular a razón de 2 ml (0.150 mg) por animal. Aplicar en la tabla del cuello o en el cuarto. Cerdas: Administrar la dosis por inyección intramuscular a razón de 1 ml (0.075 mg) por animal. Aplicar en la tabla del cuello.

INDICACIONES

Indicaciones biotécnicas: Sincronización e inducción del celo en vacas y vacas y cerdas. Sincronización del celo estral en donantes y receptoras en programas de transferencia embrionaria. Inducción del parto en cerdas.

Indicaciones terapéuticas: Desórdenes funcionales de los ovarios. Celos silenciosos por anestros post-servicio o postparto. Ciclos irregulares o anovulatorios. Cuerpo lúteo persistente. Cuerpos lúteos quísticos.

Enfermedades puerperales: endometritis, piometras.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 24 horas antes del sacrificio.

Leche: 4 horas.

NUTRICIONALES



KARIVIT AD₃E VITAMINA A+VITAMINA D₃+VITAMINA E

Solución inyectable para porcino, bovino, caprino y ovino.

Reg. Q-0265-028



500ml

COMPOSICIÓN

(Vitamina A 500,000 UI · Vitamina D₃ 75,000 UI · Vitamina E 50 mg)/1 ml

ESPECIES DE DESTINO

Porcino, bovino, caprino y ovino.

DOSIS

Por vía intramuscular profunda. Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. Animales de más de 100 kg, aplicar de 1 a 3 ml por animal. Animales con un peso de 50 a 100 kg, aplicar de 0.5 a 1 ml por animal. Animales con un peso menor de 50 kg, aplicar de 0.25 a 0.5 ml por animal.

INDICACIONES

KARIVIT AD₃E sirve para la prevención y tratamiento de deficiencias de vitamina A, D₃ y E, raquitismo, osteomalacia, tetanias, retrasos en el crecimiento, distrofias musculares, abortos y procesos de convalecencia.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 29 días antes del sacrificio.

LÍNEA PHYTOSOLUTIONS



COXSAN LÍQUIDO

Orégano + Ajo

Mezcla de aceites esenciales promotora del crecimiento.



1 L

COMPOSICIÓN

Combinación estándar de orégano y ajo.
Contenido de sustancias activas: 10,5%.

ESPECIES DE DESTINO

Aves, bovino, ovino, caprino, porcino, lepórido, crustáceos y peces.

DOSIS

Mezclar en el alimento a una dosis de:

Aves: 150 – 250 ml/1000 L de agua

Conejos: 150 – 250 ml/1000 L de agua

Cerdos: 250 – 350 ml/1000 L de agua

Rumiantes: 150 – 250 ml/1000 L de agua

Becerras lactantes: 1 – 2 ml/animal/día (añadir a la leche en una sola toma).

Crustáceos: 1 - 2 L / 1000kg de alimento.

Peces marinos y de agua dulce: 0.5 - 1 L / 1000kg de alimento.

INDICACIONES

Como aditivo promotor de crecimiento.

Util como preventivo de incidencias digestivas, tales como enteritis necrótica y diarreas no específicas.

Tratamiento preventivo de infecciones causadas por bacterias Gram⁻ (*Salmonella*, *E. Coli* y *Vibrio spp.*) y Gram⁺ (*Clostridium spp.*).

Como alternativa al tratamiento con antibióticos.

Es una alternativa al uso de occidiostatos e ionóforos.

Eficiente durante el retiro de antibióticos en la etapa previa al sacrificio.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.



LÍNEA PHYTOSOLUTIONS



COXSAN PREMIX

Orégano + Ajo

Premezcla promotora del crecimiento a base de aceites esenciales.



20 kg

COMPOSICIÓN

Combinación estándar de orégano y ajo.
Contenido de sustancias activas: 10,5%.

ESPECIES DE DESTINO

Aves, bovino, ovino, caprino, porcino, leporido, crustáceos y peces.

DOSIS

Mezclar en el alimento a una dosis de:
Pollos: 250 – 500 g/1000 kg de alimento.
Cerdos: 250 – 500 g/1000 kg de alimento.
Bovino: 250 – 500 g/1000 kg de alimento.
Ovinos y caprinos: 250 – 500 g/1000 kg de alimento.
Conejos: 250 – 500 g/1000 kg de alimento.
Crustáceos: 1 - 2 kg/1000kg de alimento.
Peces marinos y de agua dulce: 0.5 - 1kg /1000kg de alimento.

INDICACIONES

Como aditivo promotor de crecimiento.
Util como preventivo de incidencias digestivas, tales como enteritis necrótica y diarreas no específicas.
Tratamiento preventivo de infecciones causadas por bacterias Gram⁻ (*Salmonella*, *E. Coli* y *Vibrio spp.*) y Gram⁺ (*Clostridium spp.*).
Como alternativa al tratamiento con antibióticos.
Es una alternativa al uso de occidiostatos e ionóforos.
Eficiente durante el retiro de antibióticos en la etapa previa al sacrificio.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

LÍNEA PHYTOSOLUTIONS



LICOROL

Eucaliptol + Mentol

Mezcla mucolítica y expectorante a base de aceites esenciales.



1 L

COMPOSICIÓN

Eucaliptol 10% · Mentol 10% · Excipiente csp 100%

ESPECIES DE DESTINO

Aves (engorda y postura).

DOSIS

Mezclar en el agua de bebida a una dosis de:

Aves: 250 ml/1000 L de agua de bebida durante 3 a 4 días.

INDICACIONES

Mezcla de aceites esenciales utilizada como mucolítico y expectorante en problemas respiratorios, reducción de signos postvacunales y reducción de estrés calórico.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

PHYTMAX BEEF CATTLE

Cinamaldehído + Capsicum + Eugenol

Premezcla estimulante del apetito y promotora del crecimiento.



25 kg



5 kg

COMPOSICIÓN

Combinación estándar de canela (Cinamaldehído), chile (oleorresina de Capsicum) y clavo (Eugenol).
Contenido de sustancias activas: 40%

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (crecimiento y engorda), ovinos y caprinos (crecimiento y engorda).

DOSIS

Mezclar en el alimento a una dosis de:

Terneros de engorda: 100 - 150 g/1000 kg de alimento.
Terneros de engorda: 0.8 g/animal/día.
Bovino (crecimiento y engorda): 500 g/1000 kg de alimento.
Ovinos y Caprinos (crecimiento y engorda): 500 g/1000 kg de alimento.

INDICACIONES

Como aditivo promotor de crecimiento y estimulante del apetito.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

LÍNEA PHYTOSOLUTIONS



PHYTMAX DAIRY COW

Cinamaldehído + Anetol + Eugenol

Premezcla promotora de la producción láctea.



25 kg



5 kg

COMPOSICIÓN

Combinación estándar de Eugenol, Anetol, Cinamaldehído.
Contenido de sustancias activas: 44%

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, ovinos y caprinos productores de leche.

DOSIS

Mezclar en el alimento a una dosis de:

Bovino lechero: 500 mg/animal/día.
Ovinos y Caprinos: 250 mg/animal/día

INDICACIONES

Como aditivo promotor de la producción láctea, mejorador de sólidos en leche y estimulante del apetito.

TIEMPO DE RETIRO


CERO días.



PHYTOBUTYRIN

Mono, Di y Triglicéridos de ácido butírico y fitogénicos

Premezcla de monobutirinas y aceites esenciales promotora de la digestión.



25 kg

COMPOSICIÓN

Mono, Di y Triglicéridos de ácido butírico y fitogénicos
Premezcla de monobutirinas y aceites esenciales.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y aves.

DOSIS

Mezclar en el alimento a una dosis de:

Aves: 0.5 a 1kg/1000 kg de alimento.
Lechones: 1.5 a 3 kg/1000 kg de alimento.
Cerdos: 0.5 a 1 kg/1000 kg de alimento.
Rumiantes: 1 a 3 kg/1000 kg de alimento.

INDICACIONES

Phytobutyrin es un suplemento nutricional con alto poder bactericida capaz de actuar en todo el tracto intestinal, además de favorecer la digestibilidad de los alimentos.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

LÍNEA ANPARIO



BACTACID

Ácidos fórmico y propiónico

Polvo acidificante para cerdos.

Auto. A-0265-009



25 kg

COMPOSICIÓN

Ácido fórmico 23.21% · Ácido propiónico 3.88% ·
Formato de amonio 26.5% · Agua 3.5%.

ESPECIES DE DESTINO

Porcinos.

DOSIS

De 1.5 a 3 kg por 1000 kg de alimento, dependiendo de la edad del cerdo o de acuerdo a las indicaciones del médico veterinario y/o nutriólogo.

INDICACIONES

Acidificante buferado. Reduce la contaminación del alimento y ayuda en el control de las bacterias patógenas en las diferentes etapas del crecimiento de los cerdos y también en el pie de cría.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

PREFECT

Ácidos fórmico, propiónico y butírico

Premezcla acidificante para cerdos y aves.

Aut. A-0265-003



25 kg

COMPOSICIÓN

Ácido fórmico 10.98% · Ácido propiónico 6.64% · Ácido butírico 8.64%

ESPECIES DE DESTINO

Porcino y aves.

DOSIS

Aves reproductoras - alimentos prepostura - 2 kg/1000 kg de alimento.
Iniciador de pollos de engorda - 3 kg/1000 kg de alimento.
Iniciador/finalizador de pollos de engorda - 2 kg/1000 kg de alimento.
Alimento para cerdos - hasta 35 kg pv - 3 kg/1000 kg de alimento.

INDICACIONES

Prefect es un acondicionador y optimizador microbio único para el intestino de los animales monogástricos que proporciona una liberación controlada de los ácidos más un fructooligosacárido para ayudar al desarrollo de la microflora intestinal beneficiosa.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

LÍNEA ANPARIO



PHORCE

Ácidos fórmico y propiónico

Polvo acidificante para aves y porcinos.

Aut. A-0265-001



25 kg

COMPOSICIÓN

Ácido fórmico 32.4% · Ácido propiónico 16.2% ·
Formiato de amonio 26.14%.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino y aves.

DOSIS

Aves: 0.5 a 1 kg por 1000 kg de alimento.
Porcinos: 1 a 3 kg por 1000 kg de alimento.

INDICACIONES

pHorce es una mezcla líquida altamente concentrada de ácido fórmico y propiónico formulada en el innovador sistema portador de microperla de Anpario. Acidificante para el control de las bacterias enteropatógenas en el alimento terminado, regula la acidez en el tracto digestivo. Se puede agregar a cualquier materia prima o alimento como agente antiviral (Virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino, Sóneca Virus A, Peste Porcina Africana), antibacteriano y antifúngico para mejorar la higiene del alimento.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

SALKIL

Ácidos fórmico y propiónico

Premezcla acidificante para aves.

Aut. A-0265-008



25 kg

COMPOSICIÓN

Ácido fórmico 17.30% · Ácido propiónico 4.10% ·
Propionato de amonio 7.36%

ESPECIES DE DESTINO

Aves.

DOSIS

Salkil se incluye en la dieta en dosis de 2 a 4 kg/1000 kg de alimento dependiendo del riesgo del desafío. Añadir 2 kg/1000 kg en alimentos granulados o cuando se utilicen materias primas de bajo riesgo. Añadir 4 kg/1000 kg en alimentos triturados o cuando se utilicen fuentes de proteína animal.

INDICACIONES

Acidificante buferado para aves. Reduce la contaminación del alimento y ayuda en el control de las enterobacterias donde se almacena el alimento, ya sea en la fábrica o en la granja. Se puede agregar a cualquier materia prima o alimento terminado como agente descontaminante bacteriano para mejorar la higiene del alimento.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.



LÍNEA ANPARIO




NEUTOX

Aluminosilicatos, pared celular de levadura, kieselgur, propionato de calcio

Polvo adsorbente de micotoxinas.

Aut. A-0265-002



25 kg

COMPOSICIÓN

Aluminosilicatos, pared celular de levadura purificada, Kieselgur y propionato de calcio.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y aves.

DOSIS

Administración por vía oral mezclado en el alimento o materia prima. Prevención: 0.5 kg/1000 kg de alimento o materia prima. Tratamiento: 1 a 2.5 kg/1000 kg de alimento o materia prima. La tasa de inclusión del producto deberá incrementarse de manera proporcional al grado de contaminación por micotoxinas.

INDICACIONES

Neutox proporciona un sistema integral de eliminación de micotoxinas mientras previene la producción de nuevas toxinas.

TIEMPO DE RETIRO

CERO días.




LÍNEA ANPARIO



OREGO-STIM (POLVO Y LÍQUIDO)

Carvacrol y timol

Polvo y líquido con aceite
esencia de orégano.



COMPOSICIÓN

Aceite esencial de orégano, con carvacrol y timol como sustancias activas.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, ovino, caprino y aves.

DOSIS (POLVO)

Avicultura

Durante todo el ciclo de vida: 300 g por tonelada de alimento.

Cerdos

Alimentación diferenciada hasta 15 días después del destete: 1 kg por 1000 kg de alimento.

15 días después del destete hasta 25 kg de peso corporal: 500 g por 1000 kg de alimento.

25 kg de peso corporal hasta el sacrificio: 250 g por 1000 kg de alimento.

Cerdas gestantes y lactantes: 300 g por 1000 kg de alimento.

Ovejas y cabras

Iniciar con 1 kg por 1000 kg de alimento durante 28 días, seguido de una tasa de mantenimiento de 250 g por 1000 kg de alimento.

Ganado vacuno y lechero

Ganado vacuno: Iniciar con 1 kg por 1000 kg de alimento durante 28 días, seguido de una tasa de mantenimiento de 250 g por 1000 kg de alimento.

Ganado lechero: 15 g por cabeza por día durante 28 días.

DOSIS (LÍQUIDO)

Avicultura

Primer semana y durante períodos críticos: 300 ml por 1000 L de agua.

Etapas restantes: 150 ml por 1000 L de agua.

Cerdos

PreStarter hasta 15 días post-destete: 500 ml por 1000 L de agua.

15 días post-destete hasta 25 kg de peso: 250 ml por 1000 L de agua.

Desde los 25 kg hasta el sacrificio: 125 ml por 1000 L de agua.

Cerdas gestantes y lactantes: 150 ml por 1000 L de agua.

Ovejas y cabras

Dosis inicial de 500 ml por 1000 L de agua durante 28 días seguido de una dosis de mantenimiento de 125 ml por 1000 L de agua.

Ganado vacuno y lechero

Ganado vacuno de carne: Iniciar con una dosis de 500 ml por 1000 L de agua durante 28 días, seguido de una dosis de mantenimiento de 125 ml por cada 1000 L de agua.

Vacas lecheras: 15 ml por cabeza al día durante 28 días.

Terneros: Hasta 2 ml de Orego-Stim Liquid por cabeza por día.

INDICACIONES

Orego-Stim es un aditivo alimentario especializado 100% natural que favorece la salud intestinal y mejora laproductividad.


TIEMPO DE RETIRO

CERO días.

PRESENTACIONES

SACO

Bolsas de papel de estraza de tres capas con una capa interior de polietileno de baja densidad.




25 kg

20 kg

BOTELLA DE POLIETILENO


Polietileno de alta densidad con tapa de rosca.



20 L

10 L

5 L



5 L

1 L


500 ml

250 ml

100 ml

BOLSA ALUMINIZADA

Bolsas termoselladas fabricadas de un complejo de poliéster, aluminio y polietileno.



5 kg

1 kg

500 g


250 g

100 g

50 g

FRASCO

Vial de vidrio, cerrado con un tapón de caucho bromobutilo de 20 mm y sello de aluminio laqueado natural.



1 L

500 ml


250 ml

100 ml

50 ml

NOTAS

NOTAS



Para más información sobre los productos listados contacte al representante Karizoo de su zona.

*La información mostrada está sujeta a cambios sin previo aviso. Imágenes ilustrativas, la presentación final de cada producto puede variar.

Laboratorios Karizoo s.a. de c.v.
An Alivira Group Company

Av. de las Fuentes No. 70, Bodega 5,
Condominio Industrial Carcova,
Parque Industrial Finsa C.P. 76246
El Marqués, Querétro, México

T +52 (442) 962 09 47 / 8 / 9
karizoo@karizoo.com.mx
www.karizoo.com.mx



KARIZOO